

Doknr. i Barium 19304	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-04-02	Version 3
RUTIN ASIH Allergisk reaktion hos vuxna - för ASIH, Hospice, vårdavdelning palliativa sektionen			
Innehållsansvarig: Elisabet Löfdahl, Överläkare, Enhet för avancerad sjukvård i hemmet (elilo4) Godkänd av: Charlotte Widell, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (chawi3) Denna rutin gäller för: Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi			

Denna rutin är även godkänd av

Monica Arvidsson, medicinskt ledningsansvarig, Verksamhetsområde Geriatrik, lungmedicin och allergologi

Denna rutin gäller för

Ansvariga sjuksköterskor inom verksamheterna ASIH Göteborgs stad, ASIH Mölndals stad, Helhetsvården Bräcke hospice, Kålltorps hospice, Änggårdens hospice samt vårdavdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Revideringar i denna version

Ändring av rutinens namn med tillägg av Hospice och Vårdavdelning palliativa sektionen. Inj. Emerade kan upprepas var femte minut.

Syfte

Målet med nedanstående rutin för behandling av olika svårighetsgrader av allergi- och överkänslighetsreaktioner är att de skall vara ett stöd för bedömning och säker akutbehandling för de patienter som vårdas inom den Palliativa sektionen.

Arbetsbeskrivning

Kraftig lokal reaktion (Undantaget i andningsvägarna)

- T. Cetirizin 10 mg alt. T. Tavegyl 1 mg, 1-2 tabl.
- Övervakning 30 minuter.
- Kontakta ASIH-läkare eller jourläkare på Sektion Palliativ vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Urticaria/Angioödem

Symptom: obehagskänsla, klåda, flush, urticaria, rhinit, konjunktivit, munklåda, läppsvullnad, quinckeödem

- Inj. Emerade 300 microgram/ dos djupt i.m (adrenalin). Kan upprepas efter 5 minuter, särskilt till patienter där symtom uppkommer snabbt inom några minuter och andningen är påverkad. Ges ej till opåverkad patient.
- T. Cetirizin 10 mg, alt. T Tavegyl 1 mg, 1-2 tabl.
- T. Betametason 0,5 mg, 10 st. upplösta i vatten.
- Sätt nål – om möjligt.
- Övervakning, överväg transport till sjukhus vid tydlig allmänpåverkan.
- Kontakta ASIH-läkare eller jourläkare på Sektion Palliativ vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anafylaxi/chock

Kännetecknas av snabbt uppkommande symtom från flera organsystem: klåda, rodnad, urticaria, angioödem, illamående, buksmärta, kräkningar, diarré, andningssvårigheter, förvirring, medvetslöshet

- Larma, notera klockslag, ring 112.
- Tippa huvudändan.
- Inj. Emerade 300 microgram/dos(adrenalin) djupt i.m. Kan upprepas efter 5 minuter.
- Om syrgas finns, 5-10 l/min på näsgrimpa.
- Sätt nål – om möjligt.
- Inj. Betapred (4 mg/ml) 1-2 ml i.v.

Doknr. i Barium 19304	Giltigt fr.o.m 2019-04-02	Version 3
--------------------------	------------------------------	--------------

RUTIN

ASIH Allergisk reaktion hos vuxna - för ASIH, Hospice, vårdavdelning palliativa sektionen

- Vid astma ge också: Spray Salbutamol (t.ex. Airomir eller Ventoline) 4-6 doser. Upprepa var 10:e minut vid kvarvarande symtom.
- Vid chock infusion Ringer-Acetat i.v. i mycket snabb infusion.
- Glöm ej patient-ID och kontakt med anhöriga.
- Kontakta ASIH-läkare eller jourläkare Sektion Palliativ vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ansvar

Ansvariga sjuksköterskor inom verksamheterna ASIH Göteborgs stad, ASIH Mölndals stad, Helhetsvården Bräcke hospice, Kålltorps hospice, Ånggårdens hospice samt vårdavdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin. Sektionschef Palliativ vård ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen Vo GLA ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering, uppföljning och revidering ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har Sektionschef eller av denne utsedd person på Sektion Palliativ vård, Vo Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Granskare/arbetsgrupp

Framtagen av:

Sten Larnholt, Medicinskt ansvarig läkare, Enhet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), Sektion Palliativ vård, Vo Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Denna version reviderad av:

Elisabeth Löfdahl, Medicinskt ansvarig läkare, Enheten för avancerad sjukvård i hemmet, Vo Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskad av:

Hans Gunnarsson, sektionschef, Sektion Palliativ vård, Vo Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Spridningslista

Sektionschef Palliativa sektionen via linjen.