



Lena Jädefeldt Slattery MAS  
Johanna Ottosson SAS

## Riskbedömning för att identifiera om det föreligger risk för självmord

Initial riskbedömning utförs av sjuksköterska. Utförd bedömning ska rapporteras till ansvarig läkare. Läkaren ansvarar för medicinsk bedömning, utredning, ordination, behandling och uppföljning. Utförd riskbedömning, läkarens ordination/behandling med ställningstagande till hur och när uppföljning ska ske dokumenteras i patientens journal.

Namn: .....  
Personnr: .....  
Riskbedömning utförd av.....  
Datum.....

### The sad persons scale

	0 poäng	1 poäng
Kön, K (kvinna) M (man)	K	M
Ålder 19-45 < 19 år eller > 45	19-45	< 19 >45
Depression	nej	ja
Tidigare suicidförsök/ respektive suicid hos släkting	nej	ja
Alkohol/drogmissbruk	nej	ja
Tankestörning	nej	ja
Socialt nätverk saknas	nej	ja
Aktiva suicidplaner	nej	ja
Ogift, bor ensam	nej	ja
Fysisk sjukdom	nej	ja
Arbetslös	nej	ja

Många poäng indikerar hög risk.

Antal poäng.....



Lena Jädefeldt Slattery MAS  
Johanna Ottosson SAS

Läkemedel

Risk finns att suicidrisken kan öka initialt vid behandling med antidepressiva läkemedel. Vissa läkemedel, utanför psykofarmakagruppen, kan utlösa depression eller orsaka suicidhandling.

Behandlas patienten med något av följande läkemedel?

Betablockerare	nej	ja
Kortikosteroider	nej	ja
L-dopa	nej	ja
Interferon	nej	ja
Meflokin ( <i>Lariam</i> )	nej	ja
Vareniklin ( <i>Champix</i> )	nej	ja
Isotretionin ( <i>Roaccutan</i> )	nej	ja
Antiepileptika	nej	ja